

ISOLASI SENYAWA ALKALOID TURUNAN FUROKUINOLIN DARI RANTING *Toddalia* *asiatica* L. DAN UJI AKTIVITAS ANTIANKER

by Tjitjik Srie Tjahjandarie

Submission date: 20-Jan-2020 11:04AM (UTC+0800)

Submission ID: 1243850990

File name: Jurnal_Kimia_Riset_TST_2019.pdf (524.41K)

Word count: 2008

Character count: 11148

ISOLASI SENYAWA ALKALOID TURUNAN FUROKUINOLIN DARI RANTING *Toddalia asiatica* L. DAN UJI AKTIVITAS ANTIKANKER

Devina Oktari Rahayu, Tjitjik Srie Tjahjandarie, Mulyadi Tanjung*¹

¹Kimia Organik Bahan Alam, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya

*email: mulyadi-t@fst.unair.ac.id

Received 20 October 2018

Accepted 20 December 2018

Abstrak

Toddalia asiatica merupakan tumbuhan perdu yang tersebar di Afrika, Asia, Madagascar, dan Australia (Hu *et al.*, 2015). Senyawa metabolit sekunder yang ditemukan tumbuhan *Toddalia asiatica* L. adalah alkaloid. Ekstraksi senyawa alkaloid dari tumbuhan *Toddalia asiatica* L. dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol pada suhu kamar. Proses isolasi dilakukan melalui fraksinasi dan pemurnian menggunakan kromatografi kolom gravitasi, dan kromatografi radial. Hasil isolasi yang didapatkan merupakan senyawa alkaloid turunan furokuinolin yaitu skimmianin. Struktur senyawa alkaloid turunan furokuinolin yang diketahui melalui analisa hasil spektroskopi UV, IR, 1D NMR (¹H-NMR dan ¹³C-NMR), serta 2D NMR (HMBC dan HMQC) dan uji aktivitas antikanker terhadap sel kanker murin leukemia P-388.

Kata kunci : Alkaloid turunan furokuinolin, skimmianin, *Toddalia asiatica* L., antikanker

Abstract

Toddalia asiatica L. is a bushy plant that spreads in Africa, Asia, Madagascar, and Australia (Hu *et al.*, 2015). The secondary metabolite compound found in *Toddalia asiatica* L. is alkaloid. Extraction of alkaloid compounds from *Toddalia asiatica* L. by maceration using methanol at room temperature. The isolation process is diluted by fractionation and purification using column chromatography of gravity and radial chromatography. The result of isolation is an alkaloid compound derived furokuinolin, skimmianin. The structure of alkaloid compounds derived from furokuinolin known through spectroscopic analysis including UV, IR, 1D NMR (¹H-NMR and ¹³C-NMR), and 2D NMR (HMBC and HMQC) and the anticancer activity test against the cancer cells murine P-388.

Key word : Alkaloid compound derived furokuinolin, skimmianin, *Toddalia asiatica* L., anticancer

Pendahuluan

Toddalia merupakan salah satu genus dari famili Rutaceae dengan penyebaran di Afrika, Asia, Madagascar, dan Australia (Hu *et al.*, 2015). *Toddalia asiatica* atau dikenal dengan nama lokal 'akar kucing' merupakan jenis tumbuhan perdu. Senyawa

metabolit sekunder yang terdapat dalam *Toddalia asiatica* antara lain senyawa golongan alkaloid, kumarin, dan terpenoid yang memperlihatkan bioaktivitas sebagai antiinflamasi, antimikroba, antimalarial, anti HIV, anti feedant, dan antikanker (Li *et al.*, 2017, Qui *et al.*, 2012). Senyawa

alkaloid *Toddalia asiatica* memperlihatkan aktivitas antikanker terhadap sel kanker payudara, sel kanker usus besar, dan kanker kulit (Hirunwong et al., 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan menentukan struktur senyawa golongan alkaloid yang terkandung dalam ranting *Toddalia asiatica*. Dan senyawa alkaloid hasil isolasi diuji aktivitas antikanker terhadap sel murine leukemia P-388.

Metode Penelitian

Prosedur Umum

Pemisahan dan pemurnian dengan kromatografi kolom gravitasi (KKG) menggunakan silika gel G₆₀, kromatografi radial menggunakan silika gel 60 PF₂₅₄ (Merck), dan kromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan plat KLT Kieselgel 60 GF₂₅₄ 0.25 mm (Merck). Pereaksi Dragendroff digunakan sebagai penampak noda senyawa alkaloid. Bahan untuk kultur sel adalah medium RPMI-1640, fetal bovine serum (FBS), garam MTT, phosphate-buffered saline (PBS) dan dimetil sulfoksida (DMSO) sebagai bahan uji aktivitas anti-kanker. Instrumentasi yang digunakan dalam penentuan struktur alkaloid hasil isolasi antara lain meliputi spektrometer UV-Vis Shimadzu 1800, spektrometer IR Shimadzu, spektrometer NMR JEOL ECA 400 yang beroperasi pada 400 MHz.

Bahan Tanaman


Sampel penelitian adalah ranting *Toddalia asiatica* L. dari Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Padangsidempuan, Sumatra Utara. Identifikasi tumbuhan dilakukan di Herbarium Bogoriensis, Bogor, Jawa Barat.

Ekstraksi dan Isolasi

Ekstraksi serbuk ranting *Toddalia asiatica* L. seberat 7,2 kg menggunakan metanol pada suhu kamar dengan cara maserasi selama 24 jam dan dilakukan sebanyak dua kali. Hasil maserasi disaring dan pelarut diuapkan menggunakan rotary vacuum evaporator untuk menghasilkan ekstrak kental metanol (900 gr). Hasil kromaografi lapis tipis (KLT) senyawa alkaloid positif memperlihatkan adanya spot coklat kemerahan dengan pereaksi Dragendoff. Ekstrak kental metanol dipartisi dengan *n*-heksana.

Ekstraksi metanol ditambahkan asam sulfat 5% pH 3-4 dan dipartisi dengan etil asetat. Fasa asam ditambahkan ammoniak sampai larutan pH 9 dan dipartisi dengan etil asetat menghasilkan ekstrak etil asetat (ekstrak alkaloid). Ekstrak kental etil asetat dicuci dengan air sampai pH 7 menghasilkan ekstrak alkaloid sebanyak 6,53 gr.

Pemisahan ekstrak alkaloid dengan kromatografi kolom gravitasi (KKG) menggunakan campuran *n*-heksana : etil asetat (9:1 sampai 3:7) menghasilkan lima fraksi utama A-E. Pemisahan fraksi C (781,8 mg) dengan kromatografi radial dengan eluen *n*-heksana : kloroform (9:1 sampai 1:9), kloroform, dan kloroform : etil asetat 9:1 menghasilkan tiga subfraksi utama yaitu C₁-C₃. Pemurnian subfraksi C₂ dilakukan dengan menggunakan kromatografi radial dengan eluen *n*-heksana : kloroform (8:2 sampai 3:7), kloroform, kloroform : etil asetat 9:1 menghasilkan senyawa alkaloid murni sebanyak 19,7 mg yang berwujud padatan coklat kekuningan.



Gambar 1. Struktur senyawa skimmianin hasil isolasi

Skimmianin

Senyawa alkaloid berwujud padatan coklat kekuningan dengan titik leleh sebesar 176-178°C. Spektrum UV (MeOH) λ_{maks} nm (log ϵ): 241 sh (3,82); 249 (3,99); 269 (2,96); 281 (1,91); 291 (2,93); 293 (2,93); 319 (3,07); dan 331 (3,05). Spektrum IR (KBr) $\bar{\nu}_{\text{maks}}$ (cm^{-1}): 3132 (vibrasi ulur C=C furo); 3920 (vibrasi ulur C-H aromatik), 3853 (vibrasi ulur C-H aromatik), 1622; 1587; 1510; 1385; 1367 (vibrasi ulur C=C aromatik), dan 1092 (vibrasi tekuk C-O eter). Spektrum $^1\text{H-NMR}$ dan $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3) dapat dilihat pada Tabel-1.

Uji aktivitas antikanker

Uji aktivitas antikanker ekstrak etilasetat dan senyawa hasil isolasi terhadap sel kanker leukemia murin P-388 menggunakan analisis MTT setelah inkubasi selama 24 jam dalam inkubator CO_2 pada suhu 37°C.

Hasil dan Pembahasan

Skimmianin berwujud padatan coklat kekuningan dengan titik leleh 176-178°C. Spektrum UV senyawa alkaloid dalam metanol memperlihatkan serapan panjang gelombang maksimum pada λ_{maks} nm (log

ϵ): 241 sh (3,82); 249 (3,99); 269 (2,96); 281 (1,91); 291 (2,93); 293 (2,93); 319 (3,07); dan 331 (3,05).

Spektrum IR senyawa memperlihatkan $\bar{\nu}_{\text{maks}}$ (cm^{-1}): 3132 (vibrasi ulur C=C furo); 2920 (vibrasi ulur C-H aromatik), 2853 (vibrasi ulur C-H aromatik), 1622; 1587; 1510; 1385; 1367 (vibrasi ulur C=C aromatik), dan 1092 (vibrasi tekuk C-O eter terkonjugasi).

Spektrum $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz) senyawa alkaloid kuinolin turunan furokuinolin dalam CDCl_3 memperlihatkan tujuh sinyal proton pada daerah pergeseran kimia δ_{H} 4,02-8,01 ppm. Dua sinyal proton diantara tujuh sinyal proton tersebut merupakan sinyal proton aromatik. Sinyal proton aromatik tersebut merupakan sinyal proton aromatik yakni sepasang sinyal proton orto aromatik ($J = 9,3$ Hz) pada δ_{H} 8,01 dan δ_{H} 7,22 ppm. Sepasang sinyal proton dublet ($J = 2,8$ Hz) pada δ_{H} 7,57 dan δ_{H} 7,03 ppm merupakan sinyal proton dari cincin furo (Parhoodeh *et al.*, 2012). Analisis spektrum $^1\text{H-NMR}$ memperlihatkan adanya tiga sinyal proton dari metoksi pada δ_{H} 4,42, 4,02 dan 4,10 ppm. Spektrum $^{13}\text{C-NMR}$ (percobaan APT) senyawa skimmianin memperlihatkan 14 sinyal karbon yang terpisah secara sempurna. Sinyal karbon

senyawa alkaloid hasil isolasi terdistribusi atas empat atom karbon tersier CH (δ_C 143,1; 118,3; 112,0; 104,7 ppm); tujuh atom karbon kuartener (δ_C 164,4; 157,3; 152,2; 141,9; 141,5; 114,9; 103,4 ppm) dan tiga atom karbon primer dari metoksi (δ_C 61,7; 56,8; dan 59,1 ppm). Berdasarkan data spektrum 1D dan 2D NMR maka struktur senyawa alkaloid furokuinolin hasil isolasi adalah 4,7,8-trimetoksi furo-[2,3,6]kuinolin atau dikenal dengan nama senyawa skimmianin (Parhoodeh *et al.*, 2012). Berdasarkan spektrum NMR senyawa skimmianin hasil isolasi memperlihatkan kesesuaian yang tinggi dengan data spektrum NMR senyawa skimmianin yang diisolasi dari daun tumbuhan *Haplophyllum laeviusculum* (Parhoodeh *et al.*, 2012). Spektrum HMBC menunjukkan korelasi antara sinyal proton dengan sinyal karbon dalam dua atau tiga ikatan yang utama untuk mendukung struktur senyawa skimmianin.


Penempatan tiga gugus metoksi pada struktur alkaloid furokuinolin hasil isolasi berdasarkan spektrum HMBC terdapat dua proton dari cincin furo yang mempunyai posisi di H-2 dan H-3. Sinyal proton pada δ_H 7,57 memperlihatkan korelasi dua sinyal karbon kuartener (δ_C 103,4) dan satu sinyal karbon metin (δ_C 104,7 ppm). Sinyal proton dari cincin furo yang lain pada δ_H 7,03 ppm memperlihatkan korelasi dua sinyal karbon kuartener (δ_C 103,4 dan δ_C 164,4 ppm) dan satu sinyal karbon metin (δ_C 143,1 ppm).

Sinyal proton aromatik pada δ_H 8,01 ppm memperlihatkan korelasi dengan tiga sinyal karbon kuartener (δ_C 157,3; δ_C 152,2; δ_C 141,5 ppm). Sinyal karbon kuartener pada δ_C 157,3 dan δ_C 152,2 merupakan gugus metoksi. Sinyal singlet dari metoksi pada δ_H 4,42 memperlihatkan korelasi dengan sinyal karbon oksiaril pada δ_C 157,3. Sinyal singlet metoksi yang lain pada δ_H 4,10 berkorelasi dengan sinyal karbon oksiaril pada δ_C 152,2. Sinyal

proton aromatik yang lain pada δ_H 7,22 memperlihatkan korelasi tiga sinyal karbon kuartener (δ_C 152,2; δ_C 141,9; δ_C 114,9 ppm). Sinyal singlet dari metoksi pada δ_H 4,10 memperlihatkan korelasi dengan sinyal karbon oksiaril pada δ_C 152,2. Sinyal singlet metoksi yang lain pada δ_H 4,02 berkorelasi dengan sinyal karbon oksiaril pada δ_C 141,9. Adanya korelasi proton aromatik pada δ_H 7,22 dengan dua sinyal karbon oksiaril (δ_C 152,2 dan δ_C 141,9) merupakan ciri khas oksiaril posisi orto. Hasil korelasi dari dua sinyal proton aromatik dan tiga sinyal proton metoksi mempertegas kedudukan sinyal karbon δ_C 157,3 di C-4, δ_C 152,2 di C-7 dan δ_C 141,9 di C-8. Hasil korelasi ini menunjukkan sinyal proton aromatik pada δ_H 8,01 berkedudukan di H-5 dan δ_H 7,22 di H-6. Korelasi antara sinyal proton dengan sinyal karbon dalam dua atau tiga ikatan pada spektrum HMBC yang mendukung struktur senyawa skimmianin hasil isolasi dapat dilihat pada Tabel-1 dan Gambar-2.

Tabel-1. Data spektrum ^1H dan ^{13}C -NMR senyawa skimmianin dalam CDCl_3 .

No.C	δ_{H} (mult, J dalam Hz)	δ_{C}	HMBC
2	7,57 (d, 2,8)	143,1	C-3; C-3a, C-9a
3	7,03 (d, 2,8)	104,7	C-2; C3a; C-9a
3a	-	103,4	-
4	-	157,3	-
4a	-	114,9	-
5	8,01 (d, 9,3)	118,3	C-4; C-7; C-8a
6	7,22 (d, 9,3)	112,0	C-4a; C-7; C-8
7	-	152,2	-
8	-	141,9	-
8a	-	141,5	-
9a	-	164,4	-
4-OCH ₃	4,42 (s)	59,1	C-4
7-OCH ₃	4,02 (s)	56,8	C-7
8-OCH ₃	4,10 (s)	61,7	C-8

**Gambar 2.** Korelasi HMBC yang utama senyawa skimmianin hasil isolasi

Uji aktivitas antikanker ekstrak alkaloid dan senyawa skimmianin terhadap sel kanker leukemia murin P-388 memperlihatkan nilai IC_{50} sebesar 4,96 ppm dan dikategorikan lemah.

Kesimpulan

Senyawa alkaloid turunan furokuinolin, skimmianin telah berhasil diisolasi dari ranting *Toddalia asiatica* L. Struktur senyawa hasil isolasi ditetapkan berdasarkan analisis spektroskopi, meliputi UV, IR, 1D dan 2D NMR. Uji aktivitas

antikanker senyawa skimmianin dan ekstrak etilasetat terhadap sel kanker leukemia murin P-388 memperlihatkan nilai IC_{50} sebesar 4,96 ppm yang dikategorikan lemah.

Daftar Pustaka

Hirunwong, C., Sukieuma, S., Phatchanab, R., Yenjaia, C., 2016, Cytotoxic and antimalarial constituents from the roots of *Toddalia asiatica*, *Phyto. Chem. Lett.*, **17**, 242–246.

- Hu, Jiang., Shi, Xiaodong., Mao, Xia., Chen, Jiangang., Li, Hui, 2015, Amides from the roots of *Toddalia asiatica*, *Chem. Nat. Comp.*, 51(4).
- Li, W., Zhang J.S., Huang, J.L., Jiang, M.H., Xu, Y.K., Ahmed, A., Yina, S., and Tang, G.H., 2017, New prenylated coumarins from the stems of *Toddalia asiatica*. *Royal. Chem. Soc.*, vol. 7.
- Parhoodeh, P., Rahmani, M., Hashim, N.M., Sukari, M.A., Lian Ee, G.C., 2012, Alkaloid Constituents of *Haplophyllum laeviusculum* (Rutaceae), *Sains. Malay.*, 41(1), 47-52.
- Qui, H., Xiao, X., Li, G., 2012, Separation and purification of furanocoumarins from *Toddalia asiatica* (L.) Lam. using microwave-assisted extraction coupled with high-speed counter-current chromatography, *J. Sep. Sci.*

ISOLASI SENYAWA ALKALOID TURUNAN FUROKUIINOLIN DARI RANTING *Toddalia asiatica* L. DAN UJI AKTIVITAS ANTIKANKER

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

2%

2

Maria Silalahi, M Hidayat, Wawan Kurniawan.
EduFisika, 2018

Publication

2%

3

repository.unair.ac.id

Internet Source

1%

4

Sanwat Sukieum, Wichien Sang-aroon, Chavi Yenjai. " Coumarins and alkaloids from the roots of ", Natural Product Research, 2017

Publication

1%

5

Muhammad Irmawan, Frederyk Mandey, Seniwati Dali. "Isolation, Identification, Characterization, And Toxicity Essay Of Non-polar Secondary Metabolite Fraction From *Ageratum conyzoides* L", Indo. J. Chem. Res., 2018

Publication

1%

6	es.scribd.com Internet Source	1 %
7	spms.unair.ac.id Internet Source	1 %
8	Yin, J.. "Novel O-glycosidic gossypol isomers and their bioactivities", Carbohydrate Research, 20111018 Publication	1 %
9	jmolekul.com Internet Source	<1 %
10	Bo Ou Yang, Chang-Qiang Ke, Zhi-Sheng He, Yi-ping Yang, Yang Ye. "Brazilide A, a novel lactone with an unprecedented skeleton from Caesalpinia sappan", Tetrahedron Letters, 2002 Publication	<1 %
11	Nasim Sultana, James A. Armstrong, Peter G Waterman. "Benzopyran derivatives from the aerial parts of Eriostemon rhomboideus", Phytochemistry, 1999 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

ISOLASI SENYAWA ALKALOID TURUNAN FUROKUINOLIN DARI RANTING *Toddalia asiatica* L. DAN UJI AKTIVITAS ANTIANKER

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6